

Для дезинфекции с целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, могут быть использованы:

1. **хлорактивные** (таблетированные препараты с содержанием активного хлора **не менее 1,5 грамма в 1 таблетке**) – «Ди-хлор», «Жавельон», «Део-хлор» и т.д.



• 2. препараты на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений) – «Дезэфект», «Сепотосан-Т»



- 3. комплексные на основе ЧАС (с содержанием других химических групп) – «Анавидин-Комплит», «Бриллиант классик»



Препараты на основе ЧАС и комплексные более удобны для использования в качестве профилактических средств, так как:

- *относятся к 4 классу опасности (малоопасны, нетоксичны, обладают умеренным раздражающим эффектом)*
- *имеют моющие свойства (после обработки необязательно проводить влажную уборку)*
- *не взаимодействуют с поверхностями интерьера (не обесцвечивают и не портят материалы)*

Как приготовить и использовать дезрастворы на основе ЧАС:

Содержание действующего вещества в растворе должно быть не менее 0,5%.

Для достижения такой концентрации при использовании препаратов «Дезэфект», «Сепотосан-Т» требуется 50 мл. средства на 10 л. воды.

Обработка проводится **способом протирания** (ветошью) **или орошением** (распылителем типа «Квазар» или аналогом).



Расход готового (рабочего) раствора при протирании – 100-150 мл. на 1 кв.м. поверхности.

Расход готового (рабочего) раствора при орошении – 150-200 мл. на 1 кв.м. поверхности.

Экспозиция (время обязательного непрерывного действия препарата, в течение которого нельзя смывать препарат с обрабатываемых объектов) – **60 минут**

Средства индивидуальной защиты необходимые при проведении дезинфекции препаратами на основе ЧАС:

- **Влагонепроницаемые перчатки** (одноразового или многократного применения);
- **Респиратор** (полумаска фильтрующая) + **защитные очки** – **при проведении дезинфекции методом орошения;**
- *Можно использовать полнолицевую фильтрующую маску для замены респиратора с очками.*
- *Можно использовать респираторы и защитные очки для проведения строительных работ*



Дезинфекция автотранспорта

Перед дезинфекцией провести уборку, очистить все поверхности (полы, боковые поверхности, сидения, поручни и другие) от грязи



Надеть влагонепроницаемые перчатки (можно медицинские), респиратор, защитные очки (можно приобрести в строительных магазинах) перед приготовлением рабочего раствора



Приготовить рабочий раствор – 10 л. воды + 50 мл. «Дезэфект»





Использовать рабочий раствор для дезинфекции из расчета 100-150 мл. для обработки 1 кв.м. при протирании поверхностей ветошью;
150-200 мл. на 1 кв.м. при орошении.

Обрабатываться должны все доступные объекты и поверхности (полы, боковые поверхности, пассажирские двери, дверь водителя, поручни, окна, люки, сидения, ступеньки, панели приборов, руль и т.д.)



Выдержать экспозицию препарата – 60 минут.



Проветрить помещение в течение 15 минут.